FLURYSTIFTUNG
SPITAL SCHIERS

Präoperatives Abklärungsprotokoll

Patientendaten

Name / Vorname	
Geburtsdatum	
Geschlecht	
Geplante Operation	
OP-Datum	

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt

Ihre Patientin/Ihr Patient ist bei uns für die oben erwähnte Operation angemeldet.
Zur Beurteilung der Anästhesiefähigkeit bitten wir Sie, die präoperative Untersuchung nach dem untenstehenden Schema durchzuführen.
Für unsere Operationsplanung benötigen wir die Befunde spätestens 2 Wochen präoperativ.

Diagnose:				
Noxen:	☐ Nikotinabusus (Zigaretten/Tag)	☐ Alkoholabusus	☐ Medikamentenabusus	
Medikamente:				
Allergien:				
Befunde:	Gewicht:	Grösse:	BD:	HF:
Bemerkungen:				

Untersuchungen

Bis 50 Jahre:	Labor	Hb, Hk, Lc, Tc, Quick, INR, Na, K, Ca, Crea, GOT, GPT, CRP, BZ, Urinstatus
	EKG	bei kardialen Risikopatienten (KHK, Infarkt, APS, Herzfehlern, Rhythmusstörungen, Status nach Entzündungen)
	Rö-Thorax	bei chronischen Lungenerkrankungen (Asthma, COPD, Emphysem, Tumor, Pneumonie innerhalb von 6 Mte.)
Ab 50 Jahre:	Labor:	Hb, Hk, Lc, Tc, Quick, INR Na, K, Ca, Crea, GOT, GPT, CRP, BZ, Urinstatus
	EKG	wie bis 50 Jahre
	Rö-Thorax	wie bis 50 Jahre
Ab 60 Jahre	Labor	Hb, Hk, Lc, Tc, Quick, INR, Na, K, Ca, Crea, GOT, GPT, BZ, CRP, Urinstatus
	EKG	immer
	Rö-Thorax	wenn keine Aufnahme < 2 Jahre zu Verfügung steht

Lungenfunktion

- Bei allen Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion (Asthma, COPD, usw.)

Vorgehen bei Patienten mit Thrombozyten-Aggregationshemmern

Zur Primärprophylaxe:

- Aspirin resp. Plavix soll 10 Tage präoperativ abgesetzt werden.

Zur Sekundärprophylaxe:

- Aspirin nur absetzen, wenn intrakranielle oder intraspinale Neurochirurgie oder OP an der hinteren Augenkammer geplant, sonst Aspirin in der Sekundärprophylaxe nicht absetzen.

Plavix und Analoga:

- Im Regelfall 7 - 10 Tage präoperativ absetzen.
- Fortsetzen, wenn Patient koronaren drug-eluting-Stent in den letzten 12 Monaten erhalten hat.
- Fortsetzen, wenn Patient koronaren bare-metal-Stent in den letzten 6 Monaten erhalten hat.
- Fortsetzen, wenn Patient koronare Angioplastie ohne Stent in den letzten 6 Wochen hatte.
- Wenn Patient Plavix oder Analoga als Aspirinersatz einnimmt, bitte Rücksprache mit Anästhesie.

Bitte zurücksenden an:

Patientendisposition
Flury Stiftung Spital Schiers
Tersierstrasse 7
CH-7220 Schiers
FAX 081 308 08 76
patientendispo@flurystiftung.ch